


年齢/年齢群別の破傷風予防接種状況, 2007年

～ 2007年度感染症流行予測調査より ～




接種歴

■ 1回接種者	▨ 2回接種者	▩ 3回接種者	▧ 4回接種者	▦ 5回接種者	▤ 接種回数不明者	■ 未接種者
[n=68]	[n=87]	[n=348]	[n=936]	[n=186]	[n=513]	[n=220]

基礎免疫: 「初回3回(DPT)+追加1回(DPT)」または「初回2回(DT)+追加1回(DPT)」 / 追加免疫: 1回(DT)
 DPT: 百日咳ジフテリア破傷風混合ワクチン / DT: ジフテリア破傷風混合トキソイド

流行予測2007



接種歴

■ 1回接種者	▨ 2回接種者	▩ 3回接種者	▧ 4回接種者	▦ 5回接種者	▤ 接種回数不明者	■ 未接種者	□ 接種歴不明者
[n=68]	[n=87]	[n=348]	[n=936]	[n=186]	[n=513]	[n=220]	[n=1449]

基礎免疫: 「初回3回(DPT)+追加1回(DPT)」または「初回2回(DT)+追加1回(DPT)」 / 追加免疫: 1回(DT)
 DPT: 百日咳ジフテリア破傷風混合ワクチン / DT: ジフテリア破傷風混合トキソイド

流行予測2007