


年齢/年齢群別の破傷風予防接種状況, 2008年

～ 2008年度感染症流行予測調査より ～




接種歴 ■ 1回接種者 ■ 2回接種者 ■ 3回接種者 ■ 4回接種者 ■ 5回接種者 ■ 接種回数不明者 ■ 未接種者

[n=62] [n=65] [n=348] [n=894] [n=191] [n=497] [n=185]

基礎免疫: 「初回3回(DPT)+追加1回(DPT)」または「初回2回(DT)+追加1回(DPT)」 / 追加免疫: 1回(DT)
 DPT: 百日咳ジフテリア破傷風混合ワクチン / DT: ジフテリア破傷風混合トキソイド

流行予測2008



接種歴 ■ 1回接種者 ■ 2回接種者 ■ 3回接種者 ■ 4回接種者 ■ 5回接種者 ■ 接種回数不明者 ■ 未接種者 ■ 接種歴不明者

[n=62] [n=65] [n=348] [n=894] [n=191] [n=497] [n=185] [n=1599]

基礎免疫: 「初回3回(DPT)+追加1回(DPT)」または「初回2回(DT)+追加1回(DPT)」 / 追加免疫: 1回(DT)
 DPT: 百日咳ジフテリア破傷風混合ワクチン / DT: ジフテリア破傷風混合トキソイド

流行予測2008